



Verdens delirumdag - 15.mars 2023

QUIZ for helsepersonell

| Spørsmål | Riktig | Galt |
|---|--------|------|
| Delirium utvikles over mange måneder | | X |
| Delirium skyldes ofte akutt sykdom, skade eller kirurgi | X | |
| Oppmerksomhetstesting er sentralt i diagnostikken av delirium | X | |
| Psykologisk stress (eks. endrede omgivelser) kan utløse delirium | X | |
| Medikamentbivirkninger er aldri årsak til delirium | | X |
| Barn og unge voksne kan ikke få delirium | | X |
| Deliriumrisikoen er den samme uavhengig av alder | | X |
| Delirium er det samme som demens | | X |
| Demens er en sterk risikofaktor for delirium | X | |
| Delirium går vanligvis over etter noen få dager | X | |
| Delirium kan være svært plagsomt for pasienten | X | |
| Delirium øker ikke risikoen for senere behov for sykehjems plass | | X |
| Delirium øker muligens risikoen for senere utvikling av demens | X | |
| 25 % av eldre sykehuspasienter får delirium | X | |
| Behandling av underliggende sykdom er viktig i behandlingen ved delirium | X | |
| Alt helsepersonell kan mer enn nok om delirium | | X |
| Å sikre bruk av høreapparater og briller er viktig i forebygging og behandling av delirium | X | |
| Adekvat smertelindring er et viktig tiltak i forebygging og behandling av delirium | X | |
| Benzodiazepiner er god behandling ved delirium | | X |
| Antipsykotika skal kun brukes ved plagsomme hallusinasjoner/psykosefenomener hos pasienter med delirium | X | |